

PÂTURAGE DE CÉRÉALES IMMATURES OU DE CULTURES DÉROBÉES

LES SAVOIRS AGROÉCOLOGIQUES

Cherchant à optimiser l'autonomie fourragère du troupeau, les éleveurs font pâturer des mélanges céréaliers immatures et des couverts végétaux par les brebis. Les céréales immatures présentes l'avantage d'une croissance rapide au printemps et sont donc pâturées à la mise à l'herbe. L'implantation de la navette remplit plusieurs rôles : couverture du sol pendant la période hivernale et plantes fourragères valorisées à l'automne en complément du pâturage des prairies temporaires et des parcours.

Pâturage de la navette fourragère

Période	Intervention culturales	Observations
Juillet	Récolte de la céréale ou du méteil	
Août	Semis du couvert végétal (navette fourragère)	Densité de semis : 6 kg / ha Sol jamais nu pendant les périodes pluvieuses Très bonne couverture du sol Semoir : SOLA (pneumatique)
Automne	Pâturage de la navette	Précautions liées aux crucifères (météorisation)
Février/mars	Labour	Bonne destruction par le labour
Fin avril	Semis prairies temporaires	

La navette fourragère se caractérise par une facilité d'implantation et se détruit facilement avec un labour. Cette crucifère présente également l'avantage de rarement fleurir avant l'hiver. Utilisée prioritairement comme cultures piège à nitrates, l'intérêt pour la pâture est secondaire. Après les premiers jours, les brebis deviennent moins réticentes. Les risques de météorisation lors du pâturage de crucifères existants, une surveillance du troupeau est nécessaire.

Pâturage des céréales immatures – mélange vesce / avoine

Période	Interventions culturales	Observations
Juillet/Août	Déchaumage	1 semaine après
Septembre	Fumier	
	Labour	15 cm – en terres peu profondes Le labour est
	Hersage (cultivateur)	
Automne	Semis de vesce/avoine	Densité de semis
	Amendement organique (Bactériosol / Bio 3G)	Au moment de l
Printemps	Pâturage à la mise à l'herbe	Avantage : démarrage rapide de la végétation / b pâturage to

Grâce à un démarrage rapide, la parcelle de vesce / avoine est valorisée par le pâturage des

brebis à la mise à l'herbe. La parcelle de 15 ha est divisée en 4 / 5 parcs pour faire du pâturage tournant.



Céréales immatures mélange vesce / avoine pâturées 29/05/2018 crédit photo : Solagro

ZOOM SUR L'ÉLEVAGE

Race : Lacaune

800 brebis mises à la lutte, 265 agnelles mises à la lutte

26 béliers

1302 agneaux nés

Taux de mortalité : 10 à 15 %

Production laitière : 252 000 L


Production laitière par femelle saillie : 237 L

Production laitière par femelle ayant mis bas : 278 L

Production laitière par brebis traite : 336 L

crédit photo : D Production





Autonomie sur le fourrage grossier distribué en cas d'année classique (année sans sécheresse et valorisation des parcours) : 55 %.

Mise à plat du système d'élevage

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Reproduction						Lutte					Agnelage	Sevrage
Pâturage				Mise à l'herbe : mélange vesce / avoine et PT en dernière année						Couvert de navette		
Traite								Valorisation des parcours				

INTÉRÊTS DU POINT DE VUE DE L'AGRICULTEUR

Economiques	Agronomiques	Environnementaux
↘ Achat de fourrages	↗ Autonomie protéique	↗ Couverture du sol pendant la période hivernale ↘ du risque de lessivage

Difficultés rencontrées

Forte dépendance au climat et à la pluviométrie